

## АНАЛИЗ КАЛА

- Проба для исследования собирается в условиях обычного питьевого режима и характера питания;
- За 3-4 дня до исследования необходимо отменить прием медикаментов, влияющих на секреторные процессы и перистальтику (слабительные, ферменты, симпатомиметики, препараты висмута и железа), а также мешающих проведению исследования (ректальные свечи);
- При назначении посева кала на микрофлору биоматериал собирается до начала лечения антибактериальными и химиотерапевтическими препаратами, если это невозможно, то исследование проводится не ранее, чем через 12 часов после отмены препаратов;
- При сборе кала в контейнер, избегать примеси мочи и выделений из половых органов.
- Недопустимо доставлять кал на исследование в спичечных, картонных коробках, приспособленной посуде.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К СБОРУ И СДАЧИ АНАЛИЗА**

- Для получения достоверных результатов исследование не проводится у пациентов с кровотечениями (геморрой, длительные запоры, заболевания десен с признаками кровоточивости, менструации);
- После рентгенологического исследования желудка и кишечника (проведение анализа кала допустимо не ранее, чем через двое суток);
- Запрещено проводить исследование после клизмы.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛА ДОМА И ДОСТАВКИ В ЛАБОРАТОРИЮ.**

- Рекомендуется полученную пробу кала сразу доставить в лабораторию, или не позднее 30-40 минут после получения, при условии хранения в медицинском контейнере при  $T = +2 \text{ } ^\circ\text{C}$   $+4 \text{ } ^\circ\text{C}$  (имеет особое значение при назначении исследований на простейшие).